SUPER STIM

EQUILIBRIO Y VIGOR

DESDE LA FLORACIÓN HASTA EL FRUTO

BIOESTIMULANTE

FERTENIA®

Dalla natura... alla natura

BIOESTIMULANTES
FOLIARES

Ideal para:
- Cultivos hortícolas, frutales e industriales.
- Aplicaciones en momentos clave como la floración, el cuajado y el hinchamiento del fruto.

SUPER STIM

PRODUCTO DE ACCIÓN ESPECÍFICA BIOESTIMULANTE
AATC (Ácido N-Acetiltiazolidin–4Carboxílico)
+ ATC (Ácido Tiazolidin Carboxílico) 5%

PUNTOS FUERTES

- ESTIMULA LA INDUCCIÓN FLORAL Y FAVORECE EL CUAJADO DE LOS FRUTOS.
- AUMENTA EL TAMAÑO DE BAYAS, TUBÉRCULOS Y FRUTOS.
- INCREMENTA LA RESISTENCIA DE LAS PLANTAS A LOS ESTRÉS Y ESTIMULA LA RECUPERACIÓN VEGETATIVA.
- RETRASA LOS PROCESOS DE SENESCENCIA.

FORMATO DE ENVASADO
Botellas de 1 L (20x1)
Bidones de 5 l (4x5)

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: **líquida**
Densidad: - pH (sol. 1%):

CARACTERÍSTICAS

SUPER STIM es un producto con **acción específica** sobre las plantas, compuesto por la combinación de **AATC y ATC**, con propiedades **bioestimulantes**. El AATC contenido en **SUPER STIM** es un bioactivador que aumenta en los tejidos vegetales el contenido de **Prolina**, una molécula esencial para que las plantas superen el estrés, y de **Cisteína**, un efectivo activador metabólico. El producto se caracteriza por una rápida penetración en el interior de las hojas.

Aplicado regularmente durante el ciclo vegetativo, estimula y acelera el crecimiento. Cuando se aplica en cultivos afectados por cambios bruscos de temperatura o asfixia radicular, reactiva el desarrollo y protege la producción.

DOSIS Y MODO DE USO

CULTIVOS	AP. FOLIAR
CULTIVOS INDUSTRIALES Y HORTÍCOLAS A CAMPO ABIERTO: Tomate, melón, sandía, calabacín, fresa, frijol, pimiento, berenjena, patata, etc.	80-100 g/hl: Aplicar regularmente cada 10-15 días.
CULTIVOS HORTÍCOLAS EN INVERNADERO	80-100 g/hl: Desde el inicio de la floración, realizar 2-3 tratamientos.
CULTIVOS FRUTALES: Manzanos y perales (Pomáceas), ciruelos y duraznos (Drupáceas), vid, olivo, kiwi, cítricos, tropicales.	100-150 g/hl: A partir de la floración en adelante, realizar 2-3 tratamientos.
CULTIVOS DE CUARTA GAMA: Espinaca, rúcula, endivia, canónigos, lechuga, acelga de corte. HORTALIZAS: Cebolla, ajo, puerro, zanahoria, col, coliflor, colirrábano, etc.	100-150 g/hl: Desde el inicio de la floración, realizar 2-3 tratamientos regularmente cada 10-15 días.
PLANTAS AROMÁTICAS	
FLORES Y ORNAMENTALES, PLANTINES EN VIVERO	100-150 g/hl: A partir de la floración en adelante, realizar 2-3 tratamientos.
CEREALES Y LEGUMINOSAS	0,5-1,0 L/ha: En la fase de crecimiento y desarrollo de la espiga.
CULTIVOS	**FERTIRRIGACIÓN**
HORTÍCOLAS EN INVERNADERO Y A CAMPO ABIERTO	1-3 L/ha: Realizar 2-3 aplicaciones
CULTIVOS INDUSTRIALES	

COMPOSICIÓN

AATC (Ácido N-Acetiltiazolidin–4Carboxílico)	2,5%
ATC (Ácido Tiazolidin Carboxílico)	2,5%

FERTENIA s.r.l.
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y BIOLÓGICOS
FITOFORTIFICANTES - BIOESTIMULANTES

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.**fertenia**.com