



BOROLIVO™
Plus

**CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO N 3%
BORO 6% COMPLESSATO CON ETANOLAMMINA**



PUNTI DI FORZA

- SPECIFICO PER PREVENIRE E RISOLVERE LE CARENZE DI BORO
- FACILITA LA TRASLOCAZIONE DEL BORO ALL'INTERNO DELLE PIANTE
- MIGLIORA L'ALLEGAGIONE DELL'OLIVO, VITE, KIVI, FRUTTIFERI E ORTAGGI
- MIGLIORA I PROCESSI FOTOSINTETICI, GERMINATIVI E LA RADICAZIONE
- STIMOLA L'ALLUNGAMENTO DI NUOVI GERMOGLI NELL'OLIVO EVITANDO L'ALTERNANZA DI PRODUZIONE
- FAVORISCE MAGGIORE SVILUPPO VEGETO-PRODUTTIVO



Consentito in
Agricoltura
Biologica



PACKAGE

Flaconi Kg 1 (20x1)
Tanche Kg 6 (4x6)



PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Formulazione: **liquida**
Densità: **1,430**
pH (sol.1%): **8,5 ± 1**
Conducibilità (1‰):
mS/cm: **0,17**

CARATTERISTICHE

BOROLIVO Plus è un prodotto a base di **Azoto (N) organico** e **Boro complessato con etanolammina**; il prodotto, unico nel suo genere, è **ricco di aminoacidi** e **di zuccheri** che oltre alla funzione umettante, una volta all'interno delle foglie, facilitano la penetrazione del boro all'interno delle piante rendendolo particolarmente efficace su tutte le colture. Incoraggia il comportamento pronubo degli insetti imenotteri (**api e bombi**).

BOROLIVO Plus risulta dunque il prodotto specifico per affrontare le seguenti problematiche:

- SCARSA ALLEGAGIONE DELL'OLIVO, VITE, KIVI, FRUTTIFERI E ORTAGGI
- ACINELLATURA DELLA VITE
- SUBEROSITÀ DEI FRUTTI (PERO E MELO)
- CUORE CAVO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI FOTOSINTETICI, GERMINATIVI E DELLA RADICAZIONE



DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE
Vite (riduzione acinellatura)	100-150 g/hl in pre fioritura e post allegazione
Kivi	200-250 g/hl in pre fioritura, in fioritura e post allegazione
Olivo - Agrumi	100-150 g/hl in pre fioritura e post allegazione
Colture frutticole: (Pero, Melo, Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco, ecc.)	100-150 g/hl per i soli bisogni riconosciuti
Colture orticole in serra e pieno campo: (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchini, Melone, Cetriolo, Fragola, Fagiolo, Asparagi ecc.)	150-200 g/hl nella fase di 4-6 foglie
Barbabetola da zucchero, Ortaggi a foglia e da taglio, Aromatiche Cavolfiore, Carota, Girasole, Patata, Rape,	150-200 g/hl preventivamente o in caso di necessità
Leguminose, Floricole, Forestali	

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3,0%
Azoto (N) organico solubile in acqua	3,0%
Carbonio (C) organico	10,0%
Boro (B) solubile in acqua	6,0%



Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Si consiglia l'associazione con Foliar PH (acidificante - umettante delle soluzioni) 100 g/hl.

Non miscelare BOROLIVO con olii bianchi o attivati.

NON MISCELARE CON PRODOTTI A BASE DI ALLUMINIO (Al)