COMPLEX MIX PLUS

MIX DI MICROELEMENTI FLUIDI COMPLESSATI CON LS
PER APPLICAZIONE FOGLIARE

PUNTI DI FORZA

- SPECIFICO PER PREVENIRE E CURARE LE CARENZE DI MICROELEMENTI **(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn + LS)** PER APPLICAZIONE FOGLIARE
- NON PROVOCA FITOTOSSICITÀ ANCHE CON TEMPERATURE ELEVATE O TESSUTI FOGLIARI DELICATI
- COMPLESSATO CON **LS** APPORTA ALLE PIANTE TUTTI I PRINCIPALI MICROELEMENTI ANCHE A **BASSE TEMPERATURE**

Consentito in Agricoltura Biologica

PACKAGE
Flaconi Kg 1 (20x1)
Taniche Kg 6 (4x6)

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Formulazione: **liquida**
Densità: **1,290**
pH (sol.1%): **6,0 ± 1**
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: **0,20**

CARATTERISTICHE

COMPLEX MIX Plus è un concime fogliare ad alto contenuto di Microelementi specifico per prevenire e curare le carenze nutrizionali delle diverse colture. Consigliato per aumentare la **"pigmentazione"** ha un'azione sul metabolismo degli zuccheri e sulla loro migrazione all'interno dei frutti e sull'evoluzione degli antociani **(pigmenti idrosolubili)** favorendo un ruolo decisivo nella loro colorazione. L'utilizzo dell'acido **lignosolfonico (LS)** come agente complessante e l'aggiunta di specifiche sostanze ad azione umettante che impediscono l'essiccamento della soluzione sulle foglie, consentono un prolungamento del tempo di assorbimento e fanno del **COMPLEX MIX Plus** un prodotto innovativo ed estremamente efficace per assicurare il raggiungimento di elevati standard qualitativi delle produzioni. **COMPLEX MIX Plus** non provoca fitossicità anche negli interventi precoci con tessuti fogliari molto delicati.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE
Uva da tavola e da vino, Agrumi e Olivo	350-400 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi
Pomacee, Drupacee, Nocciolo	250-350 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi
KIWI - Tropicali: banano, mango, papaya...	250-350 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi
Colture orticole: Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana, Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo, ecc.	250-400 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza
Indivie, Lattughe, IV gamma e Aromatiche Leguminose, Liliaceae, Ravanello e Carota	200-300 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza
Floricole, ornamentali e tappeti erbosi Piante in Vivaio	150-200 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza
COLTURE	FERTIRRIGAZIONE
Tutte le colture	kg 2-4/1000 m²

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	0,6%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,5%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,4%
Ferro (Fe) chelato DTPA	0,4%
Manganese (Mn) solubile in acqua	2,0%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,05%
Zinco (Zn) solubile in acqua	2,6%
Zinco (Zn) complessato con LS	2,6%

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.